

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇效良方大全卷之十八

翻胃門

附論

金匱要略曰發汗令陽微隔氣虛脉乃數上為客熱不能消穀胃中虛冷故也胃氣無餘則朝食暮吐為反胃又云跌陽脉浮而濡浮則為虛濡則傷脾脾傷則不磨穀而朝食而暮吐也暮食而朝吐者宿食不化名曰反胃王冰注云以晨食入胃胃虛不能消化至暮胃氣行裏与邪相搏則食反出也巢氏曰榮衛俱虛血氣不足停水積飲而在胃腕即臍冷臍冷則脾不磨而宿食不化其氣逆而成反胃也則朝食暮吐暮食朝吐甚則食已即吐其脉緊而弦緊為寒弦為虛虛寒相搏故食已即吐曰反胃經曰食不得入是有大也食入反出是無大也諸書論之詳矣夫反胃者本乎胃食物所傷嘔吐言胃口翻也多因胃氣先逆飲酒過傷或積風寒或因憂思悵快或因蓄怒抑鬱宿滯

痢瘕積聚令痰動擾脾虛胃弱不能消磨穀食遂成此證原其所自女人得之由血氣虛損男子得之多因下元冷憊又因喜怒不常驚恐無時氣與痰搏升而不降留於咽噎則成膈噎結於痰者略之不出噎之不下有大便秘少如羊屎者名結腸反胃大抵翻胃未嘗不由膈噎而起內經謂陽結謂之膈蓋氣之與神並為陽也逸則氣神安勞則氣神耗氣神俱擾使陽氣先結陰氣後亂陰陽不和臟腑生病結於胃膈則成膈氣留於咽噎則成五噎五膈治之不當歲月因循久則反胃治法氣虛者補其氣血虛者養其血朝添陰陽化痰下氣陰陽平勻氣順痰下其證自平王冰又云食痺者食已心下痛陰上然不可忍也吐出痛止此胃氣逆而不下行也若脉更散當病食痺又脉病傳肝曰肝痺膈痛出食者是也金匱要略又有肝中寒心中風厥陰之為病三者皆以食入即吐者全在切脉用藥醫者人

之司命可不謹乎且如十膈氣散治冷膈風膈氣膈痰膈熱膈
憂膈悲膈喜膈水膈食膈對其脉證用之取効用之不當取禍
非輕且翻胃不可峻用香燥之劑治之不循次序如抱薪救火
其脉浮緩者生沉瀆者逆在乎審察慎之可也

翻胃通治方

安脾散 治胃氣先逆飲食過傷憂思蓄怒宿食痼癖積聚冷
痰動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾女人得之皆由血
氣虛損男子得之多因下元虛憊有食罷即吐有朝食暮
吐暮食朝吐所吐酸臭可畏或吐黃水凡有斯疾乃是脾
敗惟當速療遲則發煩渴大便秘水飲不得入口而不旋
踵斃矣

高良薑

一兩以百等薑上土三合散碎用水二碗煮乾薄切成片

南木香

草菓

去穢

陳橘皮

湯包去白

人參

去苗

白茯苓

白朮

胡振

丁香

各半

甘草

兩半

右為細末每服二錢食前米飲入鹽調服鹽酒不可

附子黃耆草萊飲

治翻胃不進飲食

白朮

官桂

附子

炮

厚朴

去皮姜制

蔓菁

白芍藥

白茯苓

黃耆

去芦炙

良姜

白豆蔻

檀香

甘草

炙各五分

半夏

湯泡七次

右作一服水二鍾生姜五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

丁香黃散

治翻胃嘔吐

丁香

石蓮肉

各十枚

生薑

七片

北棗

七枚

黃黍米

洗

右四味用水攪半煎去滓入黃黍米煮稀粥食之

麤白粥

治翻胃牙間久新冷熱皆治

蘇白二莖

鷄子三箇去黃

人參六分切以水一

白粟米三合

右以蘇白鷄子白白粟米三味同煮熟攪勻然後溫熱人參湯相和調頓服不拘早晚如思食即與粟米粥飲漸加粳米和之

桂苓散 治翻胃發渴

桂心

甘草各一錢半

赤茯苓

半夏

澤瀉各二升

右作一服水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

姜合丸 治中脘停痰胸膈痞結欲成翻胃

桐砂過紙上飛

肉桂去皮

附子炮去皮

茴香二錢半炒

丁香

陳皮去白

青皮去白

葶澄茄

沉香

各半兩木香一兩

右為末次入礪砂研勻酒煮麵糊為丸每兩作二十九每服一丸以生薑一塊剉為合子安藥在內溫紙裹煨令香去紙放溫細嚼鹽湯送下不拘時

養胃湯 治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐

白豆蔻仁 人參 丁香 縮砂仁

肉豆蔻 附子 炮 甘草 沉香

橘紅 麥芽 麥麴 各二升 粉草 各名錢半

右為細末每服二錢姜鹽湯下不拘時服

太倉丸 治脾胃虛弱不進飲食翻胃不食亦宜服之

白豆蔻 二兩 丁香 一兩 縮砂仁 二兩

陳倉米 一升用黃土炒米熟去土不用

右為細末用生薑自然汁法丸如梧桐子大每服百丸食後用淡姜湯送下

小半夏丸 治翻胃

半夏湯洗七次 胡椒各等分

右為細末生薑汁和丸如梧桐子大每服三五十丸食遠用生薑湯送下

十膈氣散 專治十般膈氣令膈風膈氣膈痰膈熱膈憂膈悲

膈水膈食膈喜膈

人參去芦 白茯苓 官桂去皮 枳殼去穢炒

甘草炙 神曲炒黃色 麥蘖炒黃 訶梨勒皮煨去核

蓬莪木原 京三稜煨 乾生薑炮 陳皮去白

白木各一兩 厚朴去皮姜炒 檳榔煨 木香各半兩

右為末每二錢鹽一字白湯調如脾胃不和腹脇脹滿用水一盞姜七片棗十枚鹽少許煎服

膈氣散 治五種膈氣三焦痞塞嘔吐痰逆飲食不下

方見膈噎門

五噎散

治五噎食不下嘔呃痰多咽候塞噎

方見膈噎門

五膈散

治五種膈氣胃膈痞悶痰逆惡心不進飲食

方見膈噎門

五膈寬中散

治七情之氣傷于脾胃以致陰陽不和胃膈痞

滿傳痰氣逆遂成五膈之病一切冷氣並皆治之

青皮

去白

陳皮

去白

丁香

各四

厚朴

去皮姜製

白豈寇

去破縮砂仁

木香

香附子

炒去毛

甘草

炙五

右為細末每服二錢不拘時用姜豈湯調服

五浮丸

治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐及久新翻胃皆可

服之真良方也

人參

白僵蠶絲炒去 白朮

乾薑炮

丁香

肉苳蔻鹽炒 橘紅

麥蘖炒

檳榔

白芷剉 南星炮

木香不見火

附子

炮去皮

半夏湯泡七次

甘草炙各

右為細末用白麴一分與生薑自然汁搜和作棊子大餅入百沸湯煮令浮極漉出搗爛和前藥末為丸如梧桐子大每服五十九用淡生薑湯送下不拘時服病甚者不過三服如惡熱藥者去附子大便秘者除肉苳蔻丁香餅子治脾胃虛寒痰逆嘔吐飲食減少十膈五噎翻胃

惡心並皆治之

丁香

木香各一兩

白芷剉

半夏炒

神交各半兩

白朮

白薑

陳皮各一兩半

人參

華澄茄各三錢

肉苳蔻半兩 甘草二錢

右為細末用生薑汁煮糊和作餅子如棗子大每服一餅
空心嚼細生薑湯送下

化鐵丸 治結腸翻胃兼治蠱脹緊急如鼓妨悶氣促不能坐

卧飲食頓減手足乾瘦累治不效者服之立瘥

五靈脂

去沙石青皮白

陳皮

各一兩陳稗米一合陳淨一作糯米

巴豆

三十五粒去殼膜

右各剉先炒五靈脂香透次下青皮炒候色變又下陳皮
亦炒變色却下秣米巴豆炒黃色取出以紙攤在地上出
火毒揀去巴豆不用晉三五粒亦可浸為細末用好米醋
浸化蒸餅和丸如棗豆大每服十五丸加至二十丸用葱
湯或茶湯送下婦人醋湯或艾湯送下

千轉丹

治翻胃吐食等病

牛涎

半斤 好蜜

木鱉子

三十箇去

右共一匙入銀器內用慢火熬以捫條七根撻煨乾為炭
每和白粥兩匙日進三服

鹽粟粥法 治翻胃不下食

白鹽粟米二合

人參為末一生山芋五寸長

右共用水一升二合煮取六合入生薑自然汁及鹽花少
許撻勻分二服不拘時食之亦不妨別物湯丸

甘露湯 治翻胃嘔吐不止飲食減少常服快利胸膈調養脾

胃欣進飲食常州一富人病翻胃往京口甘露寺設水陸
泊舟岸下夢一僧持湯一椀與之飲罷猶記其香味便覺
胸膈少快早入寺知客供湯乃是夢中所飲者胸膈尤快
遂求其方合數十服後疾遂瘥名曰觀音應夢散予得之
常以待賓易名曰甘露湯在臨汀療一人旋愈切勿忽之

乾餹糟頭者用六分

生薑連皮用四分

右拌勻搗爛作餅子或焙或曬乾每十兩入炙甘草二兩同研為末每服二錢用沸湯入鹽少許調不拘時服

太効散 治翻胃

田螺殼 二件不以多少在土中多年陳者尤佳各另燒成白灰研細

右每料用田螺殼灰二兩黃蛭殼灰一兩用白梅肉四兩同搜和作團以砂盒子盛蓋了鹽泥固齊發頂火煨令焦黑存性取出研細每服二錢人參縮砂煎湯調下陳米飲亦得如無盒子只以建盞兩隻相合依上法燒食前服凡寬心腹疼痛即是翻胃以此藥治之

加味青金丹 治清濁不分中焦氣痞若心下牢大如杯或黑

或熱朝食暮吐暮食朝吐其關脉弦而緊弦則為虛緊則為寒虛寒相搏此名為格與關格同也是謂之反胃

硫黃 水銀 木香 別研 丁香 別研

右先將硫黃水銀同研至無星次下木香末丁香末研勻
用生薑自然汁煮糊和丸如梧桐子大每服十五丸食前
用米飲送下

健脾胃香散 治翻胃嘔逆氣噎悶格不遠

淨全丁香 廣木香 各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎一盞時先用好黃土和泥
做成碗一箇却以藥灑在土碗內食前服滓依時再煎服
此方因臺榭吳安之得傳於內臺蓋耘夫都事自得之効
本堂試果驗蓋用土碗盛藥取其有脾胃土生助之功

鯽魚散 治翻胃

右用大鯽魚一箇去腸胗膽納綠礬末填滿縫口以炭火
炙令黃乾為細末每服一錢陳米飲調下日三服

螺泥丸 治翻胃嘔噎

右用大田螺不拘多少洗淨礱盆內養令吐出泥用米篩張灰於地上却將沙皮紙鋪於灰上去已養田螺令泥水澄清旋去上面清水却將泥傾於紙上候泥乾稠丸如梧桐子大每服三十丸薑香湯下立愈仍將田螺放江中如殺食之其病則不愈一方用爛穀燒灰服之

治翻胃朝食暮吐暮食朝吐旋即吐者

右用甘藷汁七升生姜汁一升相和打如粉分作三服

又方治翻胃

右用騾小便昔有患此疾每遇食餅或羹粥等須臾吐出真觀中許奉御弟兄及柴萼等家時稱名醫奉勅令治盤竭其術所患竟不能療漸至羸瘵死在朝夕忽有一術士云服騾小便極驗日服二合後食微吐一半哺時又食二合人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大內中

五六月人患翻胃同服一時俱瘥此物有毒服之不可過多
經取尿及熱服二合病深七日以來服之良後療人並瘥
治翻胃始因膈噎所成有痰母蟲瘕 非好手不能治

附子片一兩南星片一兩巴豆 二十一粒去皮

右用糯米一兩同炒色變去巴豆入乾薑丁香末各半同

前作末五更早掌中舌蘸乾梨半錢津化橘皮湯一呷下

又方治翻胃噎塞煩悶諸藥不効者

右以蘇合香丸與青州白丸子相和勻用生薑汁丸用蘆
根煎湯下或枳殼湯下

又方治翻胃吐黑汁

右用葶澄茄為末米糊丸姜湯下仍令服平胃散三十貼

又方治翻胃

用真阿魏末少加外野人拋下乾糞多作末五更初以姜

片蘄食能起死回生

治翻胃吐食除心胸痰水

右以年深蜆爛殼燒為白灰米飲調下一錢蚌殼亦得

治翻胃

右用附子一枚極大者坐於磚上四面以炭火逼熟淬生
姜自然汁內依前再逼再淬直待生姜汁約至半碗許却
搗為細末每服一錢用米飲調下不過三服瘥

大醫院經驗奇效良方卷之十八終

大醫院經驗奇効良方卷之十九

嘔吐噦門 附論

經曰足太陰脾之脉復從胃別上膈注心下是動則病古本強
食則嘔脉解篇云所謂食則嘔者物盛滿而上溢故也卒滿論
云寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔厥陰之病少腹堅滿厥
心病嘔吐食不下入而復出厥甚寒氣入脾急畢而吐至真要
大論云諸嘔吐逆衝上皆屬於火又云諸嘔吐酸皆屬於熱靈
樞又曰人之噦蓋數入於胃氣上注於肺寒氣和氣穀氣俱
還入胃新故相亂真邪相攻氣併相逆復出於胃故為噦又云
胃氣逆為噦又曰病深者其氣噦東垣云噦吐氣者俱屬於
胃者然司也究其三者之源皆因脾胃虛弱或因寒氣客胃
加以飲食所傷而致胃氣上逆或嘔或吐或噦者皆陰火之邪
上衝而吸入之氣不得入故食不下也邪氣亢之火逆胃中而

作者也。以其証實為異耳。如嘔者陽明也。且陽明者多血多氣。故有声有物。氣血俱病也。仲景云嘔多雖有陽明證不可攻之。孫真人云嘔家多服生薑為嘔家之聖藥也。故以生薑為主。或有形質。物為病者因而越之可也。謂上焦氣壅表實而言之。非以瀉氣而言之也。吐者太陽也。太陽多血少氣。故有物无声。為血病也。有食入則吐以橘紅主之。有食已則吐有食久則吐。噦者少陽也。少陽多氣少血。故有聲無物。氣病也。治以姜製半夏。朱奉叔治嘔吐噦以生薑橘皮半夏湯是也。又有膈噎氣意食久反出。名曰反胃。反胃者因脾胃虛寒。清穀不化。則朝食暮吐。暮食朝吐。有隨食而隨出者。脉緊澀者難治。蓋六淫之變七情之逆。未嘗不由脾胃而病也。故胃為水穀之海。上之納水穀。胃若受病。飲食不下。穀食不行。榮衛不和。則賊風虛邪犯其陽。飲食飢飽傷其陰。則嘔吐之作也。乃是足太陰足陽明二經之

病也哉金匱要略曰嘔而心下痞者有嘔而胸滿者有乾嘔而
利者有嘔吐穀不得入者有嘔吐病在膈上者有胃反嘔吐者
有食已即吐者有胃反吐而渴者有吐後欲飲食者有嘔吐涎
沫者有嘔而發熱者有乾嘔手足冷者有嘔而脈弱小便復利
身有微熱四肢厥者有似嘔不嘔者有似噦不噦心中无柰者
古人論嘔吐噦言之詳矣見證立方詳具于後全在醫者對證
用藥又有婦人懷妊嘔吐者名曰惡阻各從其類而治之又
有因時疫亂者當以溫胃養脾之劑外有脚氣攻心嘔吐者此證
多端所感不一大抵厥病順者生逆者死以厥推之藥不失其
次序治之必收功矣

嘔吐噦通治方

丁香散 治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香

不見乾姜

川烏

甘草

紅豆 去皮

良姜 炒

青皮

胡椒 各一

陳皮 二升

益智 三升 去皮

右作一服水二鍾生姜三片鹽一捻煎至一鍾不拘時服

大蘗香散 治七情傷感氣鬱于中變成嘔吐或作寒熱眩暈

痰滿不進飲食

蘼香葉

土先去

半夏

白朮

木香

不見火各

白茯苓

去皮

桔梗

去芦剉

人參

去芦

枇杷葉

制云已

官桂

不見火

甘草

炙各七

右為末每服三錢水一盞姜五片棗一枚煎七分溫服

丁香 半

夏元

治胃寒嘔吐吞酸水

丁香

不見火

白朮

半

半夏

湯泡

乾姜

炮

橘紅 各二

右為細末用生姜自然汁黃耆和丸梧桐子大每服五

七十丸食遠生薑湯送下

藿香半夏散

治胃虛中寒停痰留飲嘔吐噎逆

藿香 二錢

半夏 湯洗七次

丁香皮 一條

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾食前服

丁附治中湯 治胃寒停痰嘔吐不止

丁香

甘草 炙

青皮 炒

陳皮 炒

人參 各五分 附子 炮

白朮 煨

乾姜 各一兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎八分空心熱服

理中湯 治感寒嘔吐

方見寒門

旋覆花湯 治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花

去梗半夏 湯洗七次

橘紅

乾姜 炮 各一

檳榔

人參

白朮

甘草 各一兩

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

香薷飲 治伏暑嘔吐

方見暑門

玉浮丸 治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐

方見翻胃門

安脾散 治停飲傷胃以致與食嘔酸嘔吐黃水不已

方見翻胃門

藿香安胃散 治嘔吐不止

藿香 半夏湯洗 厚朴姜汁 蒼朮米泔水

陳皮各一 甘草炙

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

養胃湯 治脾胃虛寒不思飲食翻胃嘔吐

方見翻胃門

半夏湯

治諸噦嘔吐心下堅痞滿間有痰水眩暈

半夏

五升

茯苓

三升

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓入生姜汁再煎二三沸不拘時熱服

三乙承氣湯

治嘔吐水漿不入食即吐大便秘或利而不快

時覺腹痛滿悶或下痢赤白而嘔吐食不下者或大小腸膀胱結而不通上為嘔吐

方見傷寒門

沉香煎丸

治嘔吐除中滿痞氣痰逆惡心宿昔成積而黃腹

脹臃肺不調水穀不化此藥調順脾胃

沉香

丁香

硫黃

別研

檳榔

通黑煨

胡椒

沒藥

別研

丹砂

別研

硃砂

明淨者別

良姜

青皮

去白

木香

各一

縮砂

去皮

巴豆

去心一分

阿魏

用醋浸開月白

右除別研藥外餘藥為細末入別研藥研勻煉蜜和丸如

菰豆大磁盒盛貯封每服二丸食前臨卧用溫生薑橘皮

湯下更量入虛實大小加減

木香白朮散

治嘔而嘔食謂持實擊強是無積也胃強而乾

嘔有聲無物脾強而吐食持實擊強是以腹中痛當以和

之一名丁香半夏湯

丁香

木香

半夏

麩一兩 檳榔二兩

白朮

茯苓

甘草

右為細末每服二錢濃煎生薑芍藥湯調下有積而痛手

按之愈痛無積者按之不痛一方無丁香

丁香丸

治因食冷物凝滯胃間嘔吐不止

大丁香半兩

胡蘇

藿香

甘草 三錢

乾薑

肉桂 各二錢

右為細末湯浸蒸餅和丸如棗豆大焙乾時上乾嚼不必飲湯水水入口即愈吐如瘡痿弱更加附子隨意

大養胃湯

治飲食傷脾宿食不化朝食暮吐暮食朝吐上氣

復熱四肢冷痺三焦不調反胃虛寒氣在上憂氣在下二氣並爭但出不出入嘔不得食

厚朴 去皮

生薑 各二兩

肥棗 三兩同

白朮

山藥

人參

川芎

橘皮

當歸

五味子

藿香

枇杷葉

剉去薑汁炙

黃耆

甘草 炙各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚煎七分去滓空心服或為細末米湯調下亦可

大枳殼丸

治一切酒食所傷胃膈痞悶脇肋脹滿心腹疼痛

飲食不消痰逆嘔惡意醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼 麸炒

茯苓 去皮

白朮

厚朴 薑製

半夏 湯泡

人參

木香

青皮 去核

檳榔

陳皮 去白

荆三棱 煨

蓬朮 煨

麥蘖 微炒

神麴 炒各兩

乾生薑 半兩 牽牛 微炒

大黃 各二兩

右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服一百丸食

後用生薑湯送下

麴木丸 治中脘有宿食留飲發熱心痛口吐清水噯宿腐氣

神麴 炒三兩

蒼朮 米泔湯三宿

陳皮 各一兩

右為細末用生薑汁別煮神麴末為糊和丸如梧桐子大

每服三五十丸不拘時生薑湯送下

十珍餅子 治大人小兒嘔吐痰涎驚風難停無問久新皆治

丁香

沉香

官桂夫粗

藿香

肉苳蔻

吳茱萸湯洗

木香各半

水艮結砂

舶上茴香

各七

半夏

湯洗七次焙乾

右為細末煉蜜和丸如小豆大裡作餅子每服十餅不拘時生薑湯下或化服亦得量病加減

助胃膏 治嘔吐不食

人參

白朮

茯苓

橘皮

縮砂仁

各一

丁香

木香

肉苳蔻煨

草菓仁

各一

白苳蔻仁

一

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸生薑煎湯化下

一物湯

治卒吐逆粥飲入口即吐因弱無力

人參

二兩

右以水一大升煎取四合頓熱服兼以人參汁煮粥喫立

愈徐即中患反胃諸方不瘥只服參而愈

炮附子丸 治胃皖有熱胃中有寒嘔吐不止

右用附子炮去皮臍膜為細末以麩糊和丸如梧桐子大就濕以大黃末為衣每十九加至二十九薑湯送下

加味二陳湯 治胃熱嘔吐不已

半夏湯泡七次 陳皮各半兩 白茯苓三錢 甘草一錢半

刮筆竹青四錢

右次咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去滓不

拘時啜服

麥門冬湯 療煩熱嘔逆食下則出

麥門冬去心 青竹茹各三錢 茅根 生薑各五兩

人參 甘草各一兩

右切以水七升煮取二升五合分溫三服如人行五里送

一服不吐利忌海藻松菜

竹茹湯

治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不食

芎藭根 三兩

半夏

湯泡七

甘草 兩一

右咬咀每服五錢水二盞入竹茹如棗許生薑五片煎至七分去滓服清汁微冷細細服不拘時有熱乎足心熱政和中一人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香霍香滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃孫兆竹茹湯正相當尔亟治藥與之即時愈良方槐花散亦相類一方加棗一枚同煎

加味七氣湯

治氣鬱嘔吐

半夏

製半

人參

厚朴

製

辣桂

兩

茯苓

半一兩

甘草

炙半

右咬咀每服三錢半生薑七片棗一枚煎至七分去滓服

加木香煎亦得

小丁沉丸 治乾嘔和調胃氣

丁香

懷香子

各半兩

木香

各半兩

縮砂仁

白芷

益智

去皮

陳皮

湯浸去

沉香

甘草炙

生薑

一斤

切入

青鹽

四兩拌勻

阿魏

一分用醋半

右為細末入阿魏膏拌勻用醋煮麪糊和丸如鷄頭實大

研丹砂麝香細末各少許同為末每服一九細嚼用薑鹽

湯送下空心服

草豈寇湯 治乾嘔和胃下氣

草豈寇

去皮

藿香

枳殼

去穢

陳皮

湯浸去

白木

山芋

各半兩

桂心

去皮

丁香

各一分

右以明每服三錢水一盞棗二枚擘破粟米少許同煎至

七分去滓食前溫服

生薑丸 治乾嘔惡心 益津液和胃氣

生薑 三斤和皮切 同棗一宿浸火焙乾

甘草 炙

陳皮 乾各四兩 白焙 香白芷

縮砂仁 去皮

胡椒 略一 蓬朮 炮

右為細末以麩糊和丸如小彈子大用丹砂細末為衣每

服一丸細嚼溫酒送下食前服

開胃丸 治乾嘔氣逆不止

半夏 麩三錢 陳皮 去白

白朮 兩各

右為細末用生薑汁同棗肉和丸如梧桐子大每服二十

丸加至三十丸不拘時用粥飲送下

參粟湯 治乾嘔不下食

人參一兩 陳粟米一兩 生薑五兩

半夏易也七次去其四兩 用生薑同搗不焙乾

右同入銀石鍋中慢火焙令焦黃粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚去核煎至七分去滓微熱空心服

三聖散 治噦逆不食

半夏七枚大者先以雞子穿透心用麴搗末 丁香九粒 胡椒錢

丁香九粒 胡椒錢

右為細末大人用生薑湯調一字小兒筋頭蘸生薑汁後點藥少許口中立愈至甚者不過三服

石蓮丸 治胃寒噦逆

石蓮肉去心 附子炮裂去 乾薑炮各

右為細末用粟米粥和丸如菜豆大每服十九丸用蜀椒湯送下噦止勿再服

溫中白朮丸 治胃寒嘔噦

白朮 三兩 半夏二兩 乾薑一兩 丁香半兩

右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服三十丸不拘時生薑湯送下

思食丸 助脾胃消導飲食止吐逆

烏梅肉 五兩 神麴 炒 麥蘗 炒 各 人參

乾薑 炮 甘草 炙 各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三五十丸食前用米飲湯送下

參香枳朮丸 開胃進食止嘔吐

人參 木香 各三兩 枳實 炒 白朮 半兩

陳皮 四兩 乾生薑 半兩

右為細末用荷葉包米煨飯和丸如梧桐子大每服五七

十九不拘時用米湯送下

奇効良方十九卷

新刊太醫院奇效良方二十卷

霍亂門

附論

內經云太陰所至為中滿霍亂吐下河間言霍亂吐下濕為留飲痞膈而傳化失常故甚則霍亂吐瀉也病起于中焦皆因胃暑中熱或因渴大飲或飲而過量或飢而飽食或食而過度飲食不節寒熱不調清濁相干陰陽乖隔時當夏月風濕弱三氣應之故其邪大作矣風者風木也內應足厥陰肝木濕者濕土也內應足太陰脾土陽者火熱也內應手少陰心火此三經各為顯然之病經言諸傳反戾水液渾濁皆屬於熱熱氣燥燥於筋故筋轉而痛應風屬於肝也故諸轉筋以湯漬之而使腠理開泄陽氣散則愈矣因湯漬而愈俗反疑於寒也又言濕勝則濡瀉瀉為濕土也而脾主濕應濕屬於脾也又言諸嘔吐逆皆屬於熱王註曰炎熱薄燥心之氣也心火炎上胃膈熱甚故為

吐應屬於心也是則風動肝熱則轉筋水濕傷脾則為瀉嘔
熱乘胃則為吐三氣雜乃為霍亂又有乾霍亂濕霍亂之分吐
利並作邪氣得出名為濕霍亂十存八九設若不吐不利揮霍
擦亂邪無所出名為乾霍亂尤死一生且夫人既有入必有出
今有其入而不得出者否也塞已此其鬱甚而不通也且東垣
發明木鬱則達之意正謂此也如飽食所傷填塞胃中當吐不
吐者死也內經五亂篇云清氣在陰濁氣在陽榮氣順轉衛氣
逆行亂於胃中是謂大怵亂於腸胃則成霍亂內經又云陰之
所生本在五味陰之五官傷在五味由此觀之雖五味能養五
臟過則亦能傷人之體弱遂感前證長沙公論治之法有所主
矣若邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且利熱
多欲飲水者五苓散寒多不飲水者理中丸原病式曰大法吐
利煩渴為熱不渴為寒或熱吐利始得亦不渴者此亡津液後

必渴也。或寒本不渴，若亡津液過多，則燥而渴。但寒者，脉當沉細而遲，熱者，脉當實大而數。戴人論此死生反掌之說，為急病土為風木所尅，土化不行也。嘗以治驗而斥巢氏論因為寒之非，以及方士妄用熱劑誤治而死，主以六一散通療脾胃受傷風濕，喝三氣為邪於時宜矣。故言飲食調養之節，大忌飲食太早，謂脾胃極損，不能傳化穀入於胃，則必危矣。病安之後，宜以粥飲漸養之。大凡霍亂脉大者生，沉細而遲，氣少不語者為難治也。

霍亂通治方

霍香正氣散 治中寒霍亂嘔吐泄瀉

方見傷寒門

通脉四逆湯 治霍亂多寒，肉冷脉絕

吳茱萸

三錢 附子二錢

桂心 不見

當歸

甘草炙各一錢

白芍藥

木通

細辛各半錢

右作一服用水二鍾酒半鍾生薑七片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

薑附湯

治中寒霍亂轉筋手足厥冷

方見寒門

七氣湯

治七氣鬱結五臟之間互相刑剋陰陽不和揮霍變

亂吐利交作

半夏湯泡

厚朴

白芍藥

茯苓各二錢

桂心

紫蘇

橘紅

人參各一錢

右作一服用水二鍾生薑七片紅棗一枚煎至一鍾不拘

時服

不換金正氣散

治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼不止

方見寒門

木瓜湯 治霍亂吐瀉轉筋擾悶

酸木瓜 三錢 吳茱萸 洗心茴香二錢 甘草 一錢

右作一服用水二鍾生薑五片紫蘇十葉煎一鍾食前服

桂苓甘露飲 治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂瀉利並治之

方見暑門

枇杷葉散 治中暑轉筋煩渴引飲

方見暑門

二香散 治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香 白朮 厚朴 陳皮

茯苓 半夏 紫蘇 桔梗

白芷 香薷 黃連 扁豆 各一錢

大腹皮 甘草 各半錢

右作一服用水二鍾生薑五片葱白三根煎至一鍾不拘

時服

加味五苓散 治霍亂吐瀉其効如神

即暑門五苓散減桂加蘇木煎

加減理中湯 治霍亂嘔吐

人參

乾薑

白朮各三錢

甘草錢一

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

若爲寒氣濕所中者加附子一錢名附子理中湯

若霍亂吐瀉者加橘紅青皮各半錢一名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候吐出令透即

進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁皮半夏各一錢生薑十片煎

若泄瀉者加橘紅茯苓各一錢一名補中湯

若澀泄不已者於補中湯內加附子一錢不喜飲食水

不化者再加砂仁一錢

若霍亂嘔吐心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮加熟附子名四順湯

若傷寒結胸先加桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後胸痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳實白茯苓各一名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加栝蒌根一錢

若霍亂後轉筋者理中湯內加火煨石膏一錢

若臍上築者腎氣動也去朮加官桂半錢腎惡燥去朮恐作奔豚故加官桂

若悸多者加茯苓一錢

若渴欲飲水者加朮半錢

若寒者加乾薑半錢

若腹滿者去白朮加附子一錢

若飲酒過多及啖炙煖熱食發為鼻衄加川芎一錢若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脉只用本方
冷香湯 治夏秋傷暑引飲過食生冷無度脾胃不和遂成霍亂之證

方見暑門

止渴湯 治霍亂煩渴

人參去蘆 麥門冬去心 茯苓去皮

桔梗

瓜蒌根

葛根

澤瀉

甘草

炙各五錢

右為細末每服二錢不拘時用蜜湯調下

回生散 治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮去白

藿香

去土各半兩

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

既濟湯 治霍亂後虛煩不得眠

麥門冬去心 人參各三 淡竹葉一 附子半

半夏一 甘草各

右作一服用水二鍾生薑五片粳米百餘粒煎至一鍾不
拘時服

麥門冬湯 治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬去心 白茯苓去皮 半夏湯洗七次 橘皮

白朮各半 人參 小麥 甘草各

右作一服用水二鍾生薑五片烏梅少許同煎至一鍾不
拘時服

白朮散 治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰

老及治酒積嘔歲

白朮 茯苓去皮 人參 藿香各半

葛根 一兩

木香 二錢

甘草 二錢

右為細末每服二錢用白湯調下如煩渴加滑石二兩甚

者加薑汁續續飲之不拘時服

人參散 止吐逆及治瀉後除煩渴常服調中和氣

人參 二錢

茯苓 二錢

葛根 一錢

藿香

木香

甘草 一錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

丁香散 治霍亂吐利不止

丁香

桂心

白朮 二錢

訶黎勒 二錢

厚朴

去粗皮汁製附子 二錢

良薑 三錢

陳橘皮 湯洗去白

木瓜

乾者各一兩

右為細末每服二錢不拘時粥飲調下

乾薑湯

治霍亂吐利心腹疼痛氣逆手足冷

乾薑炮

桂心去粗皮

附子炮去皮

草豈寇去皮

木香

高良薑炒

肉豈寇去粗皮 乾木瓜

甘草炙各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

香薷丸 治冷熱不調霍亂吐瀉

香薷一兩

白扁豆炒

零陵香赤者 藿香去梗

木香各一兩

丁香皮二兩 益智仁一分

右為細末用麪糊和丸如梧桐子大每服二十九食前用

溫紫蘇湯下

霍亂證 本自胃經或因寒飲水或傷暑毒或感濕氣冷熱不

調水火相干陰陽相搏故轉筋卒痛經絡亂行暴熱吐瀉

中焦胃氣所主也察其色脉隨經標本此治霍亂吐瀉之

法也

如頭痛發熱邪自風寒而來中焦為熱相半之分邪稍高者居陽分則為熱熱多飲水者五苓散以散之如邪稍下者居陰分則為寒寒多不飲水者理中丸以溫之如吐利後有表者解之汗出厥者溫之

如既吐且利小便利大汗出內外熱者亦溫之如吐下後汗出厥逆不解脉欲絕者四逆等湯治之

如吐瀉轉筋身熱脉長陽明本病也宜和中四君子湯平胃散建中湯

四君子湯

人參

白朮

茯苓

黃耆

右剉如麻豆大每服一兩水三盞生薑五片煎至一盞去滓不拘時服

如吐瀉轉筋頭痛自汗脉虛者四君子湯加桂五錢

如吐瀉轉筋脇下痛脉弦者宜

建中加木瓜柴胡湯

平胃散加木瓜五錢亦可也

桂枝二兩

芍藥二兩

甘草一兩

膠饒半升

生薑一兩

大棗六枚

木瓜五錢

柴胡五錢

右剉如麻豆大每服一兩水三盞煎至一盞半去滓下膠

飭兩匙服

如吐瀉轉筋腹中痛體重脉沉而細者宜

四君子加白芍藥高良薑湯

四君子湯各一

芍藥

良薑各五

同煎法煎服

如吐瀉霍亂四肢拘急脉沉而遲者宜

四君子加薑附厚朴湯

四君子湯各一

生薑

附子炮

厚朴各三錢

同煎法煎服

如吐瀉四肢厥冷脉微緩者宜

建中加附子當歸湯

桂枝

一兩

芍藥

二兩

甘草

半兩

膠飴

半升

附子

三錢

當歸

三錢

生薑

一兩

大棗

六枚

同煎法煎服

丁香散

治霍亂不止

丁香

肉苳菟

去殼

木香

各一兩

右為細末每服二錢用白粥飲調熱服不拘時

正胃湯

治霍亂吐利不止

枇杷葉

拭去毛炙

厚朴

去粗皮

陳橘皮

去白

桂心

去粗皮

各半兩

右為麤末每服二錢匕水一盞入生薑三片煎至六分去

滓不拘時熱服

良薑飲 治霍亂神効

良薑

藿香

陳皮各一

甘草煨三

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分不拘時服

吳茱萸湯

治胃暑伏熱腹痛作瀉或痢并飲水過度霍亂吐

瀉其證始因飲冷或胃寒或忍飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上吐下瀉吐瀉併行頭旋眼暈手脚轉筋四肢逆冷用藥遲慢須臾不救命在頃刻之間

吳茱萸

木瓜

食鹽

各半

右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮令百沸入藥煎至二升已下傾一盞冷熱隨病人服之卒無前藥用枯白礬為末每服一大錢沸湯調服更無前藥用鹽一撮醋一盞同煎至八分溫服或鹽梅醎酸等物皆可服

治霍亂吐瀉臨時無藥

右用生蒜頭研細塗心下及兩脚心

米壹散 治備急霍亂吐利不止

右用高良薑火炙令香焦三兩打破以酒一升煮三四沸
頓服亦治腹痛氣惡一方加粳米水煮良薑作粥食之一
方用水煎服

艾熨方 治霍亂吐瀉

右用患人仰卧揉艾鋪臍上如櫟子大一指厚熨斗盛火
熨之如無熨斗以鐵子盛湯盪之亦可

訶梨勒散 治霍亂嘔吐脾胃虛冷氣隔不思飲食

訶梨勒皮三枚心三枚 澤瀉

乾薑炮 人參各半 白朮 赤芍藥 陳皮湯洗去

厚朴去粗皮薑汁塗炙 甘草炙

右咬咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時溫溫服

桔梗散 治霍亂食不消化嘔吐不止

桔梗 去蘆

陳皮 湯浸去

白朮 各一

枇杷葉 拭去毛

乾薑 炮

良薑 各半

白茯苓 三分

甘草 一分

右咬咀每服三錢用水一中盞入倉粳米五十粒紅棗三

枚同煎至六分去滓不拘時溫服

正氣丹

治下虛陰陽錯逆霍亂吐利粥食不下

半夏

作湯洗白

藿香葉 各一

硫黃 三分

水銀

一分入研黃汁

附子

炮裂去皮

右為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大以丹砂末為衣每

服二十九加至三十九不拘時米飲送下

丁香散

治霍亂嘔吐不止

丁香

藿香葉

去土

枇杷葉

拭去毛

右剉碎用水一盞生薑半錢煎七分去滓不拘時熱服

木瓜丸 治霍亂腹中冷氣下利

木瓜乾者 當歸切焙 熟艾微炒 官桂去粗

人參各半 陳橘皮湯浸 高良薑炒 訶梨勒皮

厚朴去粗皮 白朮已上各 木香半兩 赤石脂二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用米飲送下

烏梅散 治霍亂後利不止冷汗出服脇脹

烏梅肉微炒 黃連微炒 當歸微炒 附子炮裂去

熟艾已上各 阿膠綿綿炒 肉苳蔻去殼 赤石脂已上各

甘草炙半兩

右為細末不拘時以粥飲調下二錢

黃連丸 治霍亂後下利無度腹中疝痛

黃連

去鹽微炒

■藥

微炙

厚朴

去粗皮生薑汁塗炙令香熟已上各三分

當歸

微炒

乾薑

炮裂

木香

不見

地榆

已上各半兩

阿膠

搗碎黃燥一兩

右搗為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二

十九不拘時用粥飲送下

止血湯

治霍亂下焦虛寒或便利後見血

當歸

切焙

桂心

去粗皮

續斷

各三兩

生地黃

焙

乾薑

炮裂各四兩

阿膠

炙令

蒲黃

甘草

炙各二兩

右搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服日三

赤石脂湯

治霍亂下焦熱結或利下膿血煩痛

赤石脂

四兩升麻

白木

各半兩

烏梅

去核乾

乾薑

炮裂各一兩

陳廩米

微炒

梔子仁

各半兩

右搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓空心溫服

人參散

治霍亂身體疼痛四肢逆冷脈理中四順不效者

人參去蘆

白芍藥

當歸剉碎

高良薑略一

附子炮去

陳皮湯浸

桂心

白朮略一

右搗篩每服四錢用水一中盞紅棗三枚煎至六分去滓

不拘時熱服

吳茱萸湯

治霍亂多寒手足厥冷脈絕

吳茱萸

半升洗焙當歸切焙

桂心去粗皮

芍藥略三

細辛去苗

木通

甘草炙各半兩

右剉如麻豆大每服五錢匕用水二盞入生薑一棗大切

碎紅棗二枚煎至一盞去滓不拘時溫服如氣痞去棗加

葛根半兩一方無木通有木香

附子散

治霍亂腹滿虛鳴氣逆手足俱冷

附子炮裂去

草豈莖去心

陳皮湯浸

高良薑剉

桂心各半

甘草炙

右咬咀每服三錢用水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時熱服

四順附子湯

治吐瀉過多手足逆冷六脉沉細氣少不語急

服及治霍亂轉筋肉冷汗出嘔呃

附子生用

白薑炮

人參

甘草炙

各等分

右剉碎每服四錢用水二盞煎至一盞去滓空心服如服痛如桂小便不利加茯苓仍用炒鹽熨臍中一方附子炮去皮臍下甚者加龍骨服痛不止者加當歸

四陽散

治吐瀉不止或取轉多四肢發厥霍亂不省人事服

此藥四肢漸煖神識便省

右用天南星為末每服三錢入生薑五錢紅棗三枚同煎至八分溫服未省再服

胡椒湯 治霍亂煩悶欲死

胡椒三十粒 陳皮 高良薑 桂心各半

麥門冬去心 木瓜乾者各一兩

右搗篩每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

活命散 治男子婦人小兒上吐下瀉霍亂不止面色青黑命

欲臨死者宜服此藥

防風 羌活 獨活 乾薑

細辛各一分 官桂去粗皮半分 草薺各 肉薺各

川芎各半兩 吳茱萸 乾木瓜各一兩

右為細末每服三錢濃煎木瓜湯空心調連滓服

抵聖散 治霍亂宿食不消心腹疼痛

白朮二兩 良薑半兩 白茯苓去皮 吳茱萸湯泡

人參 木香 枳殼去穢炒 草薺去皮

陳皮去白

甘草炙各兩

厚朴去粗皮生薑

右為細末每服二錢匕不拘時用沸湯調服

桃葉飲 治霍亂吐利不止心腹俱痛

右用桃葉秋冬用枝搗二升以水五斗和絞取汁每服一盞不拘時溫服肘後方用桃葉三升千金方用桃葉煎汁服一升立止冬月用桃皮

鹽熨法 治霍亂吐瀉心腹作痛

右用炒鹽二碗紙包護頻其背腹上一截以熨斗盛火熨令氣透則甦仍續以炒鹽熨其背鹽湯飲之即止

木香散 治霍亂下利氣脹飲食不消

木香

丁香

白朮炒

山查子

人參

桂心去粗皮

石菖蒲

吳茱萸湯泡

陳皮湯浸

良薑

肉苳蔻去殼

草苳蔻去皮

白芷薏仁

甘草

炙各等分

右為細末每服二錢匕不拘時木瓜煎湯調下

白芷薏九

治霍亂及脾胃氣虛腹脹妨悶不思飲食

白芷薏

去皮

訶梨勒

去核

人參

去蘆各三分

乾薑

炮裂

甘草

炙微

桂心

各半兩

白朮

各半

陳橘皮

去白

厚朴

去粗皮生薑汁塗炙令黃香熟各一兩

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二十

丸不拘時生薑棗湯送下日進四五服

珍珠散

治喜怒不常憂思兼并致臟氣鬱結留聚涎飲胃腹

滿悶或腹疼痛增寒發熱吐利交作

附子

二箇一箇生用一箇炮俱去皮骨

半夏

湯浸二十一次洗去滑一兩半

成鍊鍾乳

滑石

各半兩

辰砂

三錢別研

右為末每服二錢水二盞生薑七片藿香二三葉蜜半匙

煎七分食前冷服小便不利加木通茅根煎

吳茱萸餅 治霍亂昏塞不利

吳茱萸湯泡厚朴薑汁粗製陳皮湯浸去高良薑

人參 胡椒各一分 香薷 木瓜各一分

右為細末用生薑汁半升和藥捻作餅子曝乾臨用時炙燥再碾為細末每服二錢七水一盞煎至七分溫服

乾霍亂 附論

夫霍亂者多吐利也乾霍亂者冷氣傳於胃飲食不消但腹滿煩亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐利名為乾霍亂也

厚朴湯 治乾霍亂

厚朴去粗皮生薑自然汁塗炙令黃香 枳實去穢炒 高良薑

檳榔 朴硝已上各三分 大黃二

右搗篩每服三錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服

治命散

治脾元虛損霍亂不吐瀉腹脹如鼓心胃痰壅

丁香七粒

葛根半兩

甘草炙一

生薑半兩

鹽一合

右剉碎用童子小便一盞半煎至一盞去滓分二次溫服

冬葵子湯

治乾霍亂大小便不通手足心俱熱悶亂

冬葵子

滑石碎

香薷散二

木瓜一枚細切

右搗篩每服五錢匕水二盞煎至一鍾去滓溫服大小便

通利心中快立 日四五服

中惡霍亂

附論

夫中惡霍亂者客邪內干正氣暴亂使胃中食物不化氣道否結不得宣通令人心腹卒痛吐利煩悶甚則精神冒昧靡所知識此得之鬼氣所作也

十香丸

治霍亂中惡不識人心痛腹脹不思飲食

一丁香

蘇合香

白檀香

香附子去

沉香

安息香

研

薰陸香

研

麝香

木香

高良薑

龍腦

研

白木剉燉

丹砂

研各半兩

葶撥炒

訶梨勒煨取

取

犀角銹屑

厚朴

去粗皮生薑片炙各一兩

右除別研藥外碾為細末入別研藥同研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸不拘時用溫酒送下老少加減服甚者溫酒研下日四五服以瘥為度此藥以磁盒貯之

桃枝湯

治中惡霍亂心痛胃脇疔痛喘急

桃東行枝白皮

切碎搥

官桂

去粗皮

當歸

焙各三兩

梔子仁樹

四丹砂

碎

附子

炮裂去皮麝

吳茱萸湯泡

豆豉略一兩

右剉如麻豆大每服四錢七用水二鍾生薑三片煎至一

鍾去滓不拘時溫服日三夜一

丹珠丸 治中惡霍亂垂死

丹砂研半

附子炮裂去皮臍一分研為末

雄黃三豆許研

右用巴豆七粒去皮心別研出油後入丹砂雄黃附子末同研令勻煉蜜和丸如麻子大每服三丸不拘時米飲下若下利未止加三丸至五丸與少冷粥食之即定

白薑蔻丸 治霍亂後脾胃尚虛穀氣未實津液內燥食人煩

躁勝卧不安

白薑蔻去皮陳橘皮去白

草薑蔻去皮厚朴去粗皮

官桂去粗皮乾木瓜

白木皮半夏湯洗七

人參已上各高良薑炒

縮砂去皮陳麴炒

麥蘖炒白茯苓

乾薑炮木香

桃仁去皮尖甘草炙各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸至四十九
空心用米飲送下

人參散 治霍亂吐利汗出心煩

人參去蘄 麥門冬去心 茯苓各三

白朮

黃耆 乾薑炮

桂心

甘草炙各半兩

右搗篩每服四錢用水一中盞生薑半分煎至六分去滓
頻頻溫服

竹瀝飲 治霍亂狂悶煩渴吐瀉無度氣欲絕者

竹瀝一合 粳米一合合以水二盞同煎去滓取汁用

右二味和勻頻服之

木香湯 治霍亂煩躁懊懣不得安卧

木香 乾木瓜

紫蘇各一兩 草薢各一兩 荳蔻去皮

右搗篩每服三錢七水一盞入黑豆半合許生薑三片煎

至八分去滓溫服日二

竹葉湯 治霍亂利後煩熱躁渴卧不安

右用竹葉濃煮汁飲五六合佳

藿香散 治霍亂逆滿開胃口

藿香葉焙 人參

丁香各十

訶梨勒煨去核

糯米三石

石蓮心

二百箇好無灰白

甘草煨一

右為細末每服一錢用煨和皮生薑一塊棗二枚去滓煎

湯調下早晚食前服

麥門冬湯 治霍亂逆滿不下食食即吐出煩卧不安

方見嘔吐門

白朮散 治霍亂胃氣虛乾嘔不止

白朮

人參去蘆

蘆香各一

枇杷葉煨去毛

草薢去皮 高良薑剉

各半兩

右搗篩每服三錢用水一中盞入生薑三片煎至六分去滓不拘時溫服

薤白湯 治霍亂乾嘔不止

薤白切細 生薑切細 陳皮去白

右用水二大盞煎至七分去滓分溫二服

橘皮湯 治霍亂嘔噦不止

橘皮湯浸 甘草炙 枳實去毛

右搗篩每服三錢七水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服如人行五七里再服

治霍亂轉筋方

附子炮去 白礬各三 桃枝切細 葱根切細

垂柳切細 川椒三分 生薑一兩磨以

石以水三斗煎三二十沸已來看冷暖淋多時為妙如急

即加醋五升同煎用之

附子湯 治霍亂轉筋淋足

附子一枚去皮 生椒綿裹 生薑切碎各一分 蔥半斤切碎

右以水一斗煎三兩沸入磁盆中瀝去滓以鹽漿解之冷熱得所淋洗立瘥

鹽塌方 治霍亂轉筋入腹

右用鹽三合以水五升煎取三升浸青布塌轉筋上一方煮令灼灼爾漬手足在胷脇者湯洗之入腹者倒擔病人令頭在下腹中平乃止刺者引陰陰縮者必死一方用極鹹鹽湯於槽中暖漬之

裹足法 治轉筋入腹氣急煩渴

右用木瓜二箇切破以水五升煎取三升取青布浸湯中用裹轉筋上如無木以用枝二兩煎亦得或木瓜煮汁服

亦可

治轉筋不止

右用吳茱萸木瓜等分爲末溫酒調服

治沙疰絞腸危急之甚

右用黑神散以童子小便調服如不止再服立愈

絞腸沙方 有一證心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕俗謂之絞腸

沙今考此證乃名乾霍亂此亦由山嵐瘴氣或因飢飽失時陰陽暴亂而致急用吐法此法救人不一

右用鹽半盞以熱湯數碗泡鹽令患人飲盡後却以鷄翎掃咽喉間即時吐所飲鹽湯出盡其證即愈

糯米薑水 治上吐下瀉心腹疝痛水食不下

糯米一升生薑一塊

右作一處搗細用新汲水解服如倉卒無藥掘地坑投水

攪之時澄取清飲之亦可名地漿

灸法 霍亂已死腹中尚有殘氣

右用鹽內臍中灸二十七壯仍灸氣海穴

洗法 治霍亂轉筋

右用蓼一把去兩頭水煎薰洗一方用陳蓼

漬法 治霍亂轉筋入腹

右以鹽多用煎湯漬之